

Липодерм® Ликер E-XN

Lipoderm® Licker E-XN

Жирующее средство для кожи и меха

Lipoderm® Licker E-XN – это универсальное жирующее средство, придающее коже мягкость, но вместе с тем без отдушистости. Кожа приобретает слегка маслянистый гриф и высокую прочность.

Область применения	Жирующее средство для кожи и меха
Состав	Сульфитированный натуральный эфир со специальным эмульгатором
Форма поставки	Желтоватая жидкость
Характеристика	<ul style="list-style-type: none">• анионный• активное вещество около 63 %• рН (1:10) около 7• может перекачиваться насосом• обладает слабым запахом• при смешивании с теплой водой образует тонкие, стабильные эмульсии• полученные эмульсии являются устойчивыми к действию кислот, щелочей, электролитов, а также растительных и синтетических дубителей в обычно используемых концентрациях• не содержит органически соединенных галогенов, что не ведет к нагрузке на сточные воды• может быть использован в комбинации с другими жирующими средствами

Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые границы можно взять из спецификации продукта.

Минимальный срок хранения



Этот продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 0 до 40°C минимум 12 месяцев. Содержимое начатых упаковок должно перерабатываться в кратчайший срок, а упаковка после каждого отбора продукта должна плотно закрываться. Хорошо перемешать перед использованием!

Свойства

Характерные свойства **Lipoderm® Licker E-XN**

- при смешивании с водой образует тонкие, опалесцирующие эмульсии.
- эмульсии **Lipoderm® Licker E-XN** устойчивы к действию кислот и оснований, других электролитов, а также к растительным и синтетическим дубителям в обычных концентрациях.
- совместим с анионными и неионогенными эмульгаторами, вспомогательными продуктами и жирующими средствами, а также с обычно используемыми додубливающими средствами и красителями.
- может эмульгировать до 50% растворимых в воде масел.
- для получения специальных эффектов возможно также смешивание с катионными жирующими средствами из нашего ассортимента **Lipamin® Licker**. Точное соотношение продуктов в смеси должно определяться в ходе предварительных испытаний.
- **Lipoderm® Licker E-XN** равномерно распределяется по сечению кожи.
- дополнительно он улучшает также проникновение других жиров.

Кожи, прожированные **Lipoderm® Licker E-XN**, отличаются:

- исключительной мягкостью
- хорошей прочностью лицевой поверхности
- слегка маслянистым грифом

Применение

Lipoderm® Licker E-XN является универсальным жирующим средством. Ниже приведены примеры использования продукта:

- на кожах для верха обуви он используется для улучшения прожированности и распределения жира.
- в комбинации с другими жирующими средствами **Lipoderm® Licker E-XN** позволяет получить очень мягкую кожу и поэтому рекомендуется для всех мягких типов кож. Кожа при этом остается специфически лёгкой.

- **Lipoderm® Licker E-XN** годится также для жирования всех видов меха. Оптимальной при этом является комбинация с Lipoderm® Licker PSE и Lipamin® Licker SO. **Lipoderm® Licker E-XN** выступает в этом случае как немного маслянистый компонент. С Lipoderm® Licker PSE характер смещается в сторону получения сухих кож – стабильность снова повышается. Lipamin® Licker SO достигается противоположное. Таким образом, комбинируя только два продукта Lipoderm Licker вместе с Lipoderm Licker SO, можно получать большое многообразие артикулов.

Lipoderm® Licker E-XN должен быть эмульгирован перед подачей в барабан с тёплой водой 45 – 60 °С в соотношении от 1:3 до 1:5.

Следующая таблица содержит рекомендации по расходу **Lipoderm® Licker E-XN**, который зависит от типа кож и желаемого эффекта жирования.

1) **Кожа** (процент расхода на вес строганного полуфабриката)

а) Кожа для верха обуви:

2 – 4 % **Lipoderm® Licker E-XN**

4 % Lipoderm® Licker WF или Lipoderm® Licker FP

0,5 – 1 % Lipamin® Licker NO

б) Наппа-кожа:

8 – 10 % **Lipoderm® Licker E-XN**

1 – 2 % Lipoderm® N

с) Мебельная кожа:

6 – 10 % **Lipoderm® Licker E-XN**

6 – 10 % Lipoderm® Licker CMG

д) Спиллок:

4 – 6 % **Lipoderm® Licker E-XN**

2) **Меховые шкурки**

а) в пикель, дубление или в отдельной ванне:

2 – 5 г\л **Lipoderm® Licker E-XN**

2 – 5 г\л Lipoderm® Licker PSE

б) для намазного жирования:

200 – 500 г\л **Lipoderm® Licker E-XN**

с) для жирования окрашенных шкурок:

2 – 5 г\л **Lipoderm® Licker E-XN**

Более подробная информация о продуктах фирмы BASF, рекомендуемых наряду с **Lipoderm® Licker E-XN**, содержится в соответствующих брошюрах Технической информации.

Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.

Подшейте эту брошюру в свой скоросшиватель «Wet End», реестр № 9.

Безопасность

Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и указания в **техническом паспорте по безопасности**. В остальном следует соблюдать установленные при работе с химикатами меры предосторожности и рабочей гигиены.

Примечание

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными значениями и не являются спецификацией или гарантированным свойством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают переработчика от самостоятельной проверки и испытания.

Гарантия с юридической ответственностью за определенные качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использования не может быть получена из наших данных. Получатель наших изделий несет личную ответственность за соблюдение патентного права, а также существующих законов и положений.